

REDEKAIN Pomad

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Lidokain hidroklorür'dür. **REDEKAIN Pomad**, hücre zarındaki sinirsel uyarıların oluşumunu ve iletimini engelleyerek bölgesel uyuşma sağlayan (lokal anestezik) ve kaşıntıyı önleyen bir ilaçtır. **REDEKAIN**, derideki yıpranma, tahriş ve yanıkların sebep olduğu ağrı; çeşitli nedenlere bağlı kaşıntı, meme ucu, anüs ve dudak çatlakları, hemoroid ve böcek ısırığı gibi cilt tahrişlerinin sebep olduğu ağrı ve kaşıntının giderilmesinde kullanılmaktadır. Soluk borusu içine tüp yerleştirilmesi işlemi yapılırken anestezik lubrikan (kaydırıcı) olarak da kullanılır.

REDEKAIN Pomad Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
2. **REDEKAIN**, hücre zarındaki sinirsel uyarıların oluşumunu ve iletimini engelleyerek bölgesel uyuşma sağlayan (lokal anestezik) ve kaşıntıyı önleyen bir ilaçtır.
3. Acıyı hafifletmek veya cildi uyuşturmak için gerekli olan en az miktarı kullanınız.
4. Ağız, burun, kulak ve anüs içinde oluşan deri döküntüleri ve egzamalarda kullanmayınız.
5. Kesik, şişmiş veya hasar görmüş ciltlerde kullanmayınız.
6. **REDEKAIN**'i su toplamış deriye ve açık yaralara uygulamayınız.
7. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa veya herhangi bir ilaca karşı alerjik reaksiyon öykünüz varsa **REDEKAIN**'i kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.
8. İlacın gözlerinize temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
9. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

REDEKAIN Pomad'ın kullanım Şekli:

1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
2. İlacınızı uygulayacağınız bölgenin temiz olmasına dikkat ediniz. Parmak ucuyla tedavi edilecek bölgeye ince bir tabaka halinde sürünüz ve hafifçe ovunuz.
3. Günde birkaç defa uygulanabilir

İlacın Olası Yan Etkileri :

1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
2. Uygulanan bölgede tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü yaygın görülen yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi: Lidokain hidroklorür
İlaç Marka İsmi: REDEKAIN Pomad